

Parâmetros de resultados da PAD PED

Valores adequados

Frequência Cardíaca (FC) – 80 a 160 bpm (0-2anos);

- 70 a 120 bpm (2anos - 7anos e 11 m)

Frequência Respiratória – 30 a 40 rpm (< 1 a)

- 20 a 30 bpm (2anos - 7anos e 11 m)

Saturação de Oxigénio (SpO₂)

- adequada manutenção ou redução até 5% da linha de base do utente;
- queda de saturação - redução > que 5% do índice basal após deglutição;

Parâmetros de resultados da PAD PED

Tempo de trânsito oral

Alimento Líquido

- 7 a 14 meses – até 2 segundos;
- 15 a 48 meses – até 3 segundos;
- + de 48 meses – até 4 segundos;

Consistência pastosa

- normal até 6 segundos;
- aumentado - > 6 segundos;

Alimento sólido (bolacha Maria)

- normal até 15 segundos
- aumentado - > 15 segundos;

Parâmetros de resultados da PAD PED

Tempo de alimentação

Líquido fino ou engrossado

- 2 a 5 segundos – 20 ml
- 3 a 7 segundos – 30 ml
- 4 a 12 segundos – 50 ml
- 6 a 20 segundos – 80 ml

Alimentos pastosos e sólidos – 20 a 30 min.